



Medicatiestaking bij longfunctietest

In overleg met uw huisarts heeft u besloten om binnenkort een longfunctietest te ondergaan. Om deze longfunctietest goed te kunnen uitvoeren, kan het zijn dat u voorafgaand aan de test moet stoppen met het innemen van bepaalde long- en/of allergiemedicijnen. In deze folder leest u meer over het stoppen van uw medicatie.

zekerweten

diagnostiek@rijnstate



Uw huisarts heeft met u besproken welke medicijnen u gebruikt. In onderstaand overzicht ziet u welke van deze medicijnen u moet stoppen voorafgaand aan de longfunctietest. Ook ziet u hoeveel dagen of uren voor de test u deze medicijnen niet meer moet innemen.

Belangrijk: het kan zijn dat u op verzoek van uw arts bepaalde medicatie moet blijven gebruiken. Mocht dit zo zijn, vermeldt u dit dan bij aanvang van het onderzoek!

Longmedicatie

6 uur tevoren staken

Merknaam	Generieke naam
Airomir	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Ventolin	Salbutamol

12 uur tevoren staken

Merknaam	Generieke naam
Atrovent	Ipratropium bromide
Berodual	Fenoterol + Ipratropium
Combivent	Salbutamol + Ipratropium

24 uur tevoren staken

Merknaam	Generieke naam
Aerivo	Salmeterol + Fluticason
AirFluSal	Salmeterol + Fluticason
Atimos	Formoterol
Bufoler	Formoterol + Budesonide
Busalair	Salmeterol + Budesonide
Duoresp	Formoterol + Budesonide
Elpenhaler	Salmeterol + Fluticason
Flutiform	Formoterol + Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol + Beclometason

Oxis	Formoterol
Salflutin	Salmeterol + Fluticason
Seretide	Salmeterol + Fluticason
Serevent	Salmeterol
Symbicort	Formoterol + Budesonide

36 uur tevoren staken

Merknaam	Generieke naam
Onbrez	Indacaterol
Relvar	Vilanterol + Fluticason
Singulair	Montelukast
Striverdi	Olodaterol

48 uur tevoren Staken

Merknaam	Generieke naam
Anoro	Umeclidinium + Vilanterol
Duaklir Genuair	Acidinium + Formoterol
Eklira Genuair	Acidinium
Incruse	Umeclidinium
Relegy	Umeclidinium + Vilanterol + Fluticason
Seebri	Glycopyrronium
Spiolto	Tiotropium + Olodaterol
Spiriva	Tiotropium
Tiotrus	Tiotropium
Trimbow	Glycopyrronium + Formoterol + Beclomethason
Ultibro	Glycopyrronium + Indacaterol
Xoterna	Glycopyrronium + Indacaterol

Het is niet nodig te stoppen met

Merknaam	Generieke naam
Qvar	Beclomethason
Flixotide	Fluticason
Pulmicort	Budesonide
Alvesco	Ciclesonide

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ZekerWeten, polikliniek Longgeneeskunde van Rijnstate Arnhem, telefoonnummer 088 - 005 7790.

Welkom bij ZekerWeten

Soms vindt een huisarts het nodig om in het belang van uw gezondheid verder diagnostisch onderzoek te laten doen. Diagnostisch onderzoek kan vaak meer zekerheid geven en/of bepaalde ziektebeelden uitsluiten. Voorbeelden van diagnostiek zijn bloedonderzoek, röntgenfoto's, onderzoek van weefsel (zoals van een weggenomen moedervlek) of een hartfilmpje.

U mag zelf kiezen waar en door wie u diagnostisch onderzoek laat uitvoeren. Kiest u voor ZekerWeten, dan gaat u voor snelheid en gemak maar bovenal voor de beste diagnostische expertise. Omdat we verbonden zijn met Rijnstate profiteert u direct van de expertise van de medisch specialisten van het ziekenhuis. Bovendien kunt u hierdoor rekenen op de inzet van de beste apparatuur en meetinstrumenten.

ZekerWeten

Postbus 9555
6800 TA Arnhem
088 - 005 5126

info@zekerweten.nl
www.zekerweten.nl

 [@zekerwetenvooruu](https://twitter.com/zekerwetenvooruu)